

Докази ирационалности

Недељко Стефановић

Верзија 0.3.0

4. март 2012.

Сажетак

У овом чланку ће бити приказани докази ирационалности константи и вредности функција које се раде закључно са средњом школом, а који се могу пратити са гимназијским знањем математике.

1 Помоћни ставови

У овом одељку ће бити изложени ставови који се користе у доказима ирационалности. Читалац који је упознат са њима може да прескочи овај одељак.

Теорема 1 (*Бернулијева неједнакост*) *За свако $x \geq -1$ и $n \geq 0$, уз искључивање случаја да је истовремено $x = -1$ и $n = 0$, важи*

$$(1+x)^n \geq 1+nx.$$

Доказ: За $n = 0$ тврђење се своди на $1 \geq 1$, а за $n = 1$ на $1+x \geq 1+x$. Претпоставимо да је тврђење тачно за $n = k \geq 1$ и докажимо да је тачно за $n = k+1$.

$$(1+x)^n = (1+x)^k(1+x) \geq (1+kx)(1+x) = 1+(k+1)x+kx^2 \geq 1+nx.$$

□

Теорема 2 *За ма које $q > 1$ низ q^n је растући и одозго неограничен.*

Доказ: Из $q^{n+1} = q^n q > q^n$ следи да је дати низ растући. Треба још доказати да за свако x постоји n такво да је $q^n > x$. За $x \leq 0$ то је испуњено за свако $n \in \mathbb{N}$. Уколико је $x > 0$, према теорему 1 за ма које $n \geq x/(q-1)$ важи

$$q^n = (1+(q-1))^n \geq 1+n(q-1) \geq 1 + \frac{x}{q-1}(q-1) = x+1 > x.$$

□

Теорема 3 *За ма које $q \in \mathbb{R}$ за које је $|q| < 1$ је $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$.*

Доказ: За $q = 0$ је $q^n = 0$ за све $n \in \mathbb{N}$. У супротном је $|q^n| = (|q^{-1}|^n)^{-1}$, па тврђење следи из $|q^{-1}| > 1$ и теореме 2. □

Теорема 4 За ма које $q \neq 1$ важи

$$\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q},$$

а у случају да је $|q| < 1$ важи још и

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1 - q}$$

Доказ: Први део тврђења се доказује индукцијом по n , а други део тврђења следи из првог и теореме 3. \square

Теорема 5 За ма које $a, c \in \mathbb{R}$ постоји n_0 такво да за свако $n \geq n_0$ важи $n! > ca^n$.

Доказ: Обзиром да је $ca^n \leq |ca^n| = |c||a|^n$, можемо разматрати само случај када је $a, c \geq 0$. Ако је пак $ac = 0$, онда тврђење важи за $n_0 = 1$. Стога је довољно доказати тврђење у случају да је $a, c > 0$.

Нека је $m \in \mathbb{N}$ такво да је $m > a$. Према теорему 2 постоји n_1 такво да је

$$\left(\frac{m}{a}\right)^{n_1} > \frac{ca^{m-1}}{(m-1)!}.$$

За ма које $n \geq n_0 = m + n_1 - 1$ важи

$$n! \geq a^{n-m+1}(m-1)! \left(\frac{m}{a}\right)^{n-m+1} \geq a^{n-m+1}(m-1)! \left(\frac{m}{a}\right)^{n_1} > ca^n.$$

\square

Теорема 6 За свако n важи

$$0 < \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k!} < \frac{1}{n!n}.$$

Доказ: Јасно је да сума позитивних бројева мора бити позитивна. Што се преосталог дела тиче, довољно је приметити да за $k \geq 1$ важи $(n+k)! \geq n!(n+1)^k > 0$ са једнакошћу само за $k = 1$, што се доказује индукцијом. Из тога следи да је

$$\sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k!} < \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{n!(n+1)^{k-n}} = \frac{1}{(n+1)!} \sum_{l=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^l} = \frac{1}{(n+1)!} \frac{1}{1 - \frac{1}{n+1}} = \frac{1}{n!n}.$$

\square

Теорема 7 (Ојлер)

$$e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}.$$

Доказ: Најпре приметимо да је према теорему 6 наведени ред конвергентан. Уведимо ознаке

$$e_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n, \quad e'_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}, \quad e' = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}.$$

и докажимо да је $e = \lim_{n \rightarrow \infty} e_n = e'$. Нека је дато $\varepsilon > 0$. За тако изабрано ε изаберимо n_0 такво да важи

$$\frac{1}{n_0!n_0} < \varepsilon/2.$$

Приметимо да ова релација важи за све $n \geq n_0$. За такве ε и n_0 изаберимо n_1 тако да важи

$$\sum_{k=1}^{n_0} \frac{1}{k!} \left(1 - \left(1 - \frac{1}{n_1} \right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n_1} \right) \right) < \varepsilon/2.$$

Овакав избор је могућ, јер се заменом свих појављивања n_1 са n у изразу на левој страни претходне неједнакости добија коначна сума чији сви сабирци теже нули када n неограничено расте, а то је тачно зато што је производ који фигурише у сваком од сабирака сачињен од увек истог броја чинилаца од којих сваки тежи јединици. Приметимо да ова релација важи за све $n \geq n_1$. Приметимо да је

$$e_n = 1 + \sum_{k=1}^n \frac{n \cdots (n-k+1)}{k!} \frac{1}{n^k} = 1 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n} \right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n} \right) < e'_n < e'.$$

За ма које $n \geq \max\{n_0, n_1\}$ важи

$$0 < e' - e_n < \sum_{k=1}^{n_0} \frac{1}{k!} \left(1 - \left(1 - \frac{1}{n} \right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n} \right) \right) + \sum_{k=n_0+1}^{\infty} \frac{1}{k!} < \varepsilon.$$

□

Теорема 8 Сваки природан број већи од 1 је дељив неким простим бројем.

Доказ: У супротном постоји најмањи природан број n већи од 1 који није дељив ниједним простим бројем. Обзиром да је дељив самим собом, а није дељив ниједним простим бројем, он мора бити сложен. Међутим, онда он има делиоца мањег од себе, а већег од 1, који стога мора имати простог делиоца. Међутим, број n је дељив истим тим простим бројем. □

Теорема 9 (Еуклид) Простих бројева има бесконачно много.

Доказ: У супротном, нека су p_1, \dots, p_k сви прости бројеви. Број

$$n = p_1 \cdots p_k + 1$$

је већи од 1, а није дељив ниједним простим бројем, што противречи теорему 8. □

Теорема 10 За

$$R(x) = a_0 + \cdots + a_n x^n$$

важи $R^{(k)}(0) = a_k k!$ за $k \leq n$, односно $R^{(k)}(0) = 0$ за $k > n$.

Доказ: Најпре индукцијом по n докажимо да је n -ти извод полинома x^m једнак $\frac{m!}{(m-n)!} x^{m-n}$ за $n \leq m$, односно 0 иначе.

Тврђење очигледно важи за $n = 0$. Претпоставимо да важи за $n = k$ и докажимо да важи за $n = k + 1$. Ако је $n > m$, онда је по индуктивној претпоставци k -ти извод полинома x^m константан, па је n -ти извод истог полинома једнак нули. Ако је пак $n \leq m$, онда је по индуктивној претпоставци

$$(x^m)^{(n)} = \left((x^m)^{(n-1)} \right)' = \left(\frac{m!}{(m-n+1)!} x^{m-n+1} \right)' = \frac{m!(m-n+1)}{(m-n+1)!} x^{m-n} = \frac{m!}{(m-n)!} x^{m-n}.$$

Из управо доказаног следи да за $k > n$ важи $R^{(k)}(x) = 0$, а за $k \leq n$

$$R^{(k)}(x) = \sum_{i=0}^{n-k} a_{k+i} \frac{(k+i)!}{i!} x^i,$$

одакле следи да је $R^{(k)}(0) = a_k k!$. \square

Теорема 11 Нека је P полином са целим коефицијентима и $Q(x) = P(x)x^n$. Број $Q^{(k)}(0)$ је цео и дељив са $(n+1)!$ за све $k \neq n$ и $Q^{(n)}(0) = P(0)n!$.

Доказ: Нека је

$$P(x) = \alpha_0 + \dots + \alpha_p x^p.$$

У том случају је

$$Q(x) = \alpha_0 x^n + \dots + \alpha_p x^{n+p}.$$

Тврђење следи из теореме 10 и $P(0) = \alpha_0$. \square

Теорема 12 За ма који полином $P(x)$ и $Q(x) = P(x^2)$ је $Q^{(n)}(0) = 0$ за сваки непаран природан број n .

Доказ: Тврђење непосредно следи из теореме 10. \square

2 Основне особине рационалних и ирационалних бројева

Теорема 13 Вредност рационалне функције са рационалним коефицијентима за рационалне вредности променљивих је рационалан број ако је дефинисана, односно ако је вредност рационалне функције са рационалним коефицијентима за неке вредности променљивих дефинисана и ирационалан број, онда је бар једна од вредности променљивих ирационалан број.

Доказ: Обзиром да је производ пара рационалних бројева рационалан број индукцијом по броју чинилаца се лако доказује да је сваки коначан производ рационалних бројева рационалан број. Стога је вредност било ког монома са рационалним коефицијентом за рационалне вредности променљивих рационалан број.

Обзиром да је збир пара рационалних бројева рационалан број, индукцијом по броју сабирака се лако доказује да је сваки коначан збир рационалних бројева рационалан број. Стога и на основу претходног је вредност било ког полинома са рационалним коефицијентима за рационалне вредности променљивих је рационалан број.

Најзад, тврђење следи из претходног и чињенице да је количник рационалних бројева, ако је дефинисан, рационалан број. \square

Теорема 14 Сваки рационалан број има периодичан запис у било којој основи. Ниједан ирационалан број нема периодичан запис ни у једној основи.

Доказ: Нека је $b \geq 2$ било која основа и претпоставимо да је број x облика

$$x = a + \sum_{i=1}^{\infty} \frac{a_i}{b^i}, \quad a \in \mathbb{Z}, \quad a_i \in \{0, \dots, b-1\}$$

као и да за неке природне бројеве m и n важи $a_{i+m} = a_i$ за све $i > n$. Очигледно је

$$\sum_{i=n+1}^{\infty} \frac{a_i}{b^i} = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{i=1}^m \frac{a_{n+mk+i}}{b^{n+mk+i}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{b^{n+mk}} \sum_{i=1}^m \frac{a_{n+i}}{b^i} = \frac{b^{m-n}}{b^m - 1} \sum_{i=1}^m \frac{a_{n+i}}{b^i}.$$

Из претходног следи да је

$$x = a + \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{b^i} + \frac{b^{m-n}}{b^m - 1} \sum_{i=1}^m \frac{a_{n+i}}{b^i}.$$

Обрнуто, нека $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}$ и

$$\frac{p}{q} = a + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d_n}{b^n}$$

где је $a \in \mathbb{Z}$ и $d_n \in \{0, \dots, b-1\}$. Такође, можемо претпоставити¹ да нису сви чланови низа d_n почев од неког једнаки $b-1$. Стога је

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{d_n}{b^n} < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b-1}{b^n} = \frac{1}{b}. \quad (1)$$

Са $[t]$, где је t било који реалан број, означимо највећи цео број који није већи од t , то јест такав цео број да важи $[t] \leq t < [t] + 1$, или еквивалентно $t - 1 < [t] \leq t$. Обзиром на (1), важи

$$[bx] = \left[d_1 + b \sum_{n=2}^{\infty} \frac{d_n}{b^n} \right] = d_1,$$

па је

$$bx - [bx] = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d_{n+1}}{b^n}.$$

Имајући ово у виду, индукцијом се доказује да за низ

$$x_0 = x, \quad x_n = bx_{n-1} - [bx_{n-1}]$$

важи

$$x_i = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d_{n+i}}{b^n}.$$

Такође, из неједнакости $t - 1 < [t] \leq t$ која је тачна за свако $t \in \mathbb{R}$ следи да је $\geq 0t - [t] < 1$, такође за свако $t \in \mathbb{R}$, па је $x_n \in [0, 1)$ за свако $n \geq 1$. Обзиром да је $[t] \in \mathbb{Z}$ за свако $t \in \mathbb{R}$, индукцијом се доказује да је $bx_n \in \mathbb{Z}$ за свако $n \geq 0$. Стога, за свако $n \geq 1$ важи

$$x_n \in \left\{ \frac{0}{q}, \dots, \frac{q-1}{q} \right\},$$

па пошто сви чланови бесконачног низа припадају коначном скупу, постоје природни бројеви k и l такви да је $k < l$ и $x_k = x_l$. Коришћењем те чињенице, индукцијом се доказује да је $x_{k+i} = x_{l+i}$ за свако $i \geq 0$, односно низ x_n је периодичан. Но, обзиром да за свако $n \geq 1$ важи

$$d_n = [bx_{n-1}],$$

децимални развој броја x је периодичан. \square

¹У противном је наведени децимални развој броја x свакако периодичан.

3 Директне методе

Да бисмо формулисали следећу теорему, уведимо следећу ознаку: За природан број n и прост број p нека је $s(n, p)$ такав цео ненегативан број m да $p^m | n$ и $p^{m+1} \nmid n$. Другим речима, ако је за међусобно различите просте бројеве p_1, \dots, p_k испуњено

$$n = p_1^{s_1} \cdots p_k^{s_k},$$

онда је $s(n, p_i) = s_i$, односно $s(n, p) = 0$ за све остале просте бројеве p . Такође, дефинишимо $s(m/n, p)$ за $m, n \in \mathbb{N}$ као $s(m, p) - s(n, p)$. Јасно је да за ма које $k \in \mathbb{N}$ важи

$$s(km, p) - s(kn, p) = (s(k, p) + s(m, p)) - (s(k, p) + s(n, p)) = s(m, p) - s(n, p),$$

тако да је ова дефиниција коректна.

Теорема 15 Нека су $a = a_1/a_2$ и $b = b_1/b_2$ за неке $a_1, a_2, b_1, b_2 \in \mathbb{N}$, при чему је $b \neq 1$. У том случају је број $\log_b(a) = m/n$ за $m \in \mathbb{Z}$ и $n \in \mathbb{N}$ ако и само ако је

$$ns(a, p) = ms(b, p)$$

за све просте бројеве p , односно број $\log_b(a)$ је рационалан ако и само ако је

$$s(a, p) = 0 \Leftrightarrow s(b, p) = 0$$

за све просте бројеве p и притом за просте бројеве p за које је $s(a, p), s(b, p) \neq 0$ однос $s(a, p)/s(b, p)$ константан.

Доказ: Следи из чињенице да је $\log_b(a) = m/n$ еквивалентно са $a = b^{m/n}$, односно $a^n = b^m$ и постојања тачно једне факторизације сваког природног броја већег од 1 преко простих. \square

Теорема 16 Нека су $m, n, k \in \mathbb{N}$ такви да је $\text{NZD}(m, n) = 1$. У том случају важи

$$\sqrt[k]{m/n} \in \mathbb{Q} \Leftrightarrow \sqrt[k]{m}, \sqrt[k]{n} \in \mathbb{Z}.$$

Доказ: Смер здесна улево је очигледан. Докажимо смер слева удесно. Претпоставимо супротно, да барем један од бројева $\sqrt[k]{m}$ и $\sqrt[k]{n}$ није цео и да је $\sqrt[k]{m/n} = p/q$ за неке природне узајамно просте бројеве p и q , односно да важи $m/n = p^k/q^k$, тј.

$$mq^k = np^k. \quad (2)$$

Приметимо да из претпоставке да бар један од бројева $\sqrt[k]{m}$ и $\sqrt[k]{n}$ није цео следи да нису оба од бројева m и n једнака 1, па се последња једнакост не своди на $1 = 1$. Из те чињенице, једнакости (2) и $\text{NZD}(m, n) = 1$ следи да је $u = \text{NZD}(m, p) > 1$ или $v = \text{NZD}(n, q) > 1$. Дакле, за неке m', n', p', q' важи $m = m'u$, $n = n'v$, $p = p'u$ и $q = q'v$, при чему је

$$\text{NZD}(m', p') = \text{NZD}(n', q') = \text{NZD}(u, v) = 1.$$

Једнакост (2) можемо записати у облику

$$m'q'^k uv^k = n'p'^k u^k v,$$

или после скраћивања са uv

$$m'q'^k v^{k-1} = n'p'^k u^{k-1}.$$

Обзиром да ниједан прост број не дели обе стране једнакости, оне морају бити једнаке 1, што је обзиром на то да је барем један од бројева u и v већи од 1 могуће само у случају $k = 1$, што противречи претпоставци да бар један од бројева $\sqrt[k]{m}$ и $\sqrt[k]{n}$ није цео. \square

4 Метод корена полинома

Теорема 17 Нека је

$$P(x) = a_n x^n + \dots + a_0, \quad a_0, a_n \neq 0$$

полином са целим коефицијентима и нека су $p \in \mathbb{Z}$ и $q \in \mathbb{N}$ узајамно прости бројеви такви да важи $P(p/q) = 0$. У том случају $p|a_0$ и $q|a_n$.

Доказ: Множењем једнакости

$$a_n \frac{p^n}{q^n} + \dots + a_0 = 0$$

са q^n добијамо једнакост

$$\sum_{k=0}^n a_k p^k q^{n-k} = 0$$

из које следе једнакости

$$a_0 q^n = -p \sum_{k=1}^n a_k p^{k-1} q^{n-k} \quad \text{и} \quad a_n p^n = -q \sum_{k=0}^{n-1} a_k p^k q^{n-k-1}.$$

Из $p|a_0 q^n$ и $q|a_n p^n$ и чињенице да су бројеви p и q узајамно прости, следи тврђење. \square

Обзиром да сваки цео број различит од нуле има коначно много делилаца, ова теорема нам омогућава да одредимо коначан скуп рационалних бројева који обухвата све корене датог полинома са целим коефицијентима, а да онда заменом рационалних бројева из тог скупа одредимо који су од њих заиста корени и тако одредимо све рационалне корене полинома са целим коефицијентима.

На тај начин се ирационалност бројева може доказивати проналажењем полинома коме је дати број корен. Уколико пронађени полином нема рационалних корена, одмах знамо да је дати број ирационалан, а у супротном треба доказати само његову различитост од рационалних корена тог полинома, што се обзиром да је скуп корена полинома коначан може учинити на пример довољно тачним нумеричким рачунањем датог броја.

Докажимо на пример да је број $a = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ ирационалан. Заиста,

$$\begin{aligned} a^2 &= 5 + 2\sqrt{2}\sqrt{3}, \\ (a^2 - 5)^2 &= 24, \\ a^4 - 10a^2 + 1 &= 0. \end{aligned}$$

Дакле, $P(a) = 0$ за $P(x) = x^4 - 10x^2 + 1$. Обзиром да евентуални рационални корени овог полинома морају бити облика p/q за узајамно просте $p \in \mathbb{Z}$ и $q \in \mathbb{N}$ такве да $p|1$ и $q|1$, то јест $p \in \{-1, 1\}$ и $q \in \{1\}$, једини евентуални рационални корени овог полинома су 1 и -1. Међутим, обзиром да је $P(1) = P(-1) = -8 \neq 0$, број $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ је ирационалан.

Докажимо да је број $b = 2\sqrt{3} - \frac{1}{\sqrt{2}}$ ирационалан. То је еквивалентно са ирационалношћу броја $2b = 4\sqrt{3} - \sqrt{2}$. Очигледно је

$$\sqrt[3]{2}^2 = 2(2\sqrt{3} - b),$$

односно

$$2(2\sqrt{3} - 2b)^3 = 1.$$

Након развијања последње једнакости добијамо да је

$$12(b^2 + 4)\sqrt{3} = 2b^3 + 72b + 1.$$

Након квадрирања добијамо да је b корен полинома

$$4x^6 - 144x^4 + 4x^3 + 1728x^2 + 144x - 6911.$$

Обзиром да је 6911 прост број, једини евентуални рационални корени овог полинома су

$$\pm 6911, \quad \pm \frac{6911}{2}, \quad \pm \frac{6911}{4},$$

при чему се непосредном провером утврђује да ниједан од њих није корен наведеног полинома. Стога је број b ирационалан.

Досадашња решења су захтевала досетке. Наведимо један општији, али дужи поступак одређивања потребног полинома. Послужимо се истим примером броја b . Најпре бројеве $\sqrt{3}$, $\sqrt[3]{2}$, $\sqrt[3]{2}\sqrt{3}$, $\sqrt[3]{2}^2$ и $\sqrt[3]{2}^2\sqrt{3}$ поређајмо у неком редоследу, рецимо у наведеном и сматрајмо касније наведен број »тежим«. Циљ нам је да поступно елиминисемо »теже« чланове по цену добијања »лакших«, које ћемо накнадно елиминисати по цену увођења још »лакших« и тако даље док их све не елиминисемо. Пођимо од основне једнакости

$$b = 2\sqrt{3} - \sqrt[3]{2}^2/2.$$

У њој је »најтежи« члан $\sqrt[3]{2}^2$, па га изразимо преко осталог.

$$\sqrt[3]{2}^2 = 4\sqrt{3} - 2b.$$

Даље је

$$b^2 = 12 + \sqrt[3]{2}/2 - 2\sqrt[3]{2}^2\sqrt{3}.$$

Овде је »најтежи« члан $\sqrt[3]{2}^2\sqrt{3}$, па изразимо њега преко осталог.

$$\sqrt[3]{2}^2\sqrt{3} = -b^2/2 + 6 + \sqrt[3]{2}/4.$$

Даље је

$$b^3 = -1/2 + 24\sqrt{3} + 3\sqrt[3]{2}\sqrt{3} - 18\sqrt[3]{2}^2.$$

Овде је »најтежи« члан $\sqrt[3]{2}^2$, који је изражен преко »лакших« елемената једном од претходних једначина. Након замене је

$$b^3 - 36b = -1/2 - 48\sqrt{3} + 3\sqrt[3]{2}\sqrt{3}.$$

Сада је »најтежи« члан $\sqrt[3]{2}\sqrt{3}$, па изразимо њега преко осталог.

$$\sqrt[3]{2}\sqrt{3} = b^3/3 - 12b + 1/6 + 16\sqrt{3}.$$

Даље је

$$b^4 = 144 - 4\sqrt{3} + 36\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{2}^2/4 - 48\sqrt[3]{2}^2\sqrt{3}.$$

Овде је »најтежи« елемент $\sqrt[3]{2}^2\sqrt{3}$, који је изражен преко »лакших« једном од претходних једначина. После замене је

$$b^4 - 24b^2 + 144 = -4\sqrt{3} + 12\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{2}^2/4.$$

Овде је »најтежи« елемент $\sqrt[3]{2}$. Међутим, и он је већ изражен преко »лакших«. После замене је

$$b^4 - 24b^2 + b/2 + 144 = -\sqrt{3} + 12\sqrt[3]{2}.$$

Сада је »најтежи« елемент $\sqrt[3]{2}$, па га изразимо преко осталог.

$$\sqrt[3]{2} = b^4/12 - 2b^2 + b/24 + 12 + \sqrt{3}/12.$$

Настављајући овај поступак изразићемо још и $\sqrt{3}$ преко b (јер више нема »лакших« елемената) а онда уврштавајући све то у израз за b^6 добићемо тражени полином.

5 Број e и функције e^x и $\ln(x)$

Теорема 18 (Ојлер) *Број e је ирационалан.*

Доказ: Претпоставимо супротно, да је $e = m/n$ за неке $m, n \in \mathbb{N}$. Обзиром да се вредност разломка не мења када бројилац и именилац помножимо истим бројем различитим од нуле, можемо претпоставити да је $n > 1$. Уз симболику из теореме 7 важи

$$0 < n!(e - e_n) < \frac{1}{n},$$

што је немогуће, јер је број $n!(e - e_n)$ цео. \square

Теорема 19 (Ламберт) *За ма које $x \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ број e^x је ирационалан.*

Доказ: Из идентитета $e^{-x} = (e^x)^{-1}$ следи да је теорему довољно доказати у случају када је $x > 0$. Нека је

$$I_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \int_{-x}^x (x^2 - t^2)^n e^t dt.$$

Непосредним рачунањем изводимо да је

$$I_0(x) = \int_{-x}^x e^t dt = e^t \Big|_{-x}^x = e^x - e^{-x},$$

а двоструком парцијалном интеграцијом да важи

$$\begin{aligned} I_1(x) &= \frac{1}{2} \int_{-x}^x (x^2 - t^2) e^t dt = \frac{1}{2} \left((x^2 - t^2) e^t \Big|_{-x}^x + \int_{-x}^x 2t e^t dt \right) \\ &= \int_{-x}^x t e^t dt = t e^t \Big|_{-x}^x - \int_{-x}^x e^t dt = x(e^x + e^{-x}) - e^t \Big|_{-x}^x = (x-1)e^x + (x+1)e^{-x}. \end{aligned}$$

Такође двоструком парцијалном интеграцијом добијамо да за $n \geq 2$ важи

$$\begin{aligned}
I_n(x) &= \frac{1}{2^n n!} \int_{-x}^x (x^2 - t^2)^n e^t dt \\
&= \frac{1}{2^n n!} \left((x^2 - t^2)^n e^t \Big|_{-x}^x + \int_{-x}^x 2nt(x^2 - t^2)^{n-1} e^t dt \right) \\
&= \frac{1}{2^{n-1} (n-1)!} \int_{-x}^x t(x^2 - t^2)^{n-1} e^t dt \\
&= \frac{1}{2^{n-1} (n-1)!} \left(t(x^2 - t^2)^{n-1} e^t \Big|_{-x}^x - \int_{-x}^x ((x^2 - t^2) - 2(n-1)t^2)(x^2 - t^2)^{n-2} e^t dt \right) \\
&= \frac{-1}{2^{n-1} (n-1)!} \int_{-x}^x ((2n-1)(x^2 - t^2) - 2(n-1)x^2)(x^2 - t^2)^{n-2} e^t dt \\
&= -\frac{2n-1}{2^{n-1} (n-1)!} \int_{-x}^x (x^2 - t^2)^{n-1} e^t dt + \frac{x^2}{2^{n-2} (n-2)!} \int_{-x}^x (x^2 - t^2)^{n-2} e^t dt \\
&= -(2n-1)I_{n-1}(x) + x^2 I_{n-2}(x).
\end{aligned}$$

Из доказаних једнакости

$$\begin{aligned}
I_0(x) &= e^x - e^{-x}, \\
I_1(x) &= (x-1)e^x + (x+1)e^{-x} \\
n \geq 2 &\Rightarrow I_n(x) = -(2n-1)I_{n-1}(x) + x^2 I_{n-2}(x)
\end{aligned}$$

слиди да за свако n постоје полиноми P_n и Q_n са целим коефицијентима, степена највише n такви да важи

$$I_n(x) = P_n(x)e^x + Q_n(x)e^{-x}.$$

Такође, $I_n(x) > 0$ као интеграл позитивне функције. Претпоставимо да су бројеви $x > 0$ и e^x рационални и изведимо контрадикцију. Нека су $u, v, p, q \in \mathbb{N}$ такви да је $x = u/v$ и $e^x = p/q$. Очигледно важи

$$I_n(x)v^n pq = P_n(u/v)v^n p^2 + Q_n(u/v)v^n q^2.$$

Обзиром да су P_n и Q_n полиноми са целим коефицијентима степена не већег од n , бројеви $P_n(u/v)v^n$ и $Q_n(u/v)v^n$ су цели, па је вредност израза на десној страни једнакости цео број. Но, вредност израза на левој страни једнакости је већа од нуле, па је

$$I_n(x)v^n pq \geq 1,$$

односно

$$I_n(x) \geq \frac{1}{v^n pq}.$$

Са друге стране је

$$I_n(x) \leq \frac{1}{2^n n!} \int_{-x}^x x^{2n} e^x dt = \frac{x^{2n+1} e^x}{2^{n-1} n!}.$$

Из последње две неједнакости закључујемо да важи

$$\frac{1}{v^n pq} \leq \frac{x^{2n+1} e^x}{2^{n-1} n!},$$

односно

$$n! \leq 2x e^x pq \left(\frac{x^2}{2}\right)^n,$$

Обзиром да n може бити произвољно велики природан број, овде имамо контрадикцију са теоремом (5). \square

Приметимо да тврђење теореме 18 такође следи из теореме 19.

Теорема 20 (Ламберт) *Ако је $x \in \mathbb{Q} \setminus \{1\}$ и $x > 0$, онда је број $\ln(x)$ ирационалан.*

Доказ: Претпоставимо супротно. У том случају је $y = \ln(x)$ рационалан број различит од нуле, па је према теорему 19 број $x = e^y$ ирационалан, што противречи претпоставци. \square

6 Број π

Теорема 21 (Лежандр) *Број π^2 је ирационалан.*

Доказ: Нека је

$$I_n = \frac{1}{n!} \int_0^{\pi/2} (\pi^2/4 - t^2)^n \cos(t) dt.$$

Непосредним рачунањем изводимо да је

$$I_0 = \int_0^{\pi/2} \cos(t) dt = \sin(t)|_0^{\pi/2} = 1,$$

а двоструком парцијалном интеграцијом да важи

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^{\pi/2} (\pi^2/4 - t^2) \cos(t) dt = (\pi^2/4 - t^2) \sin(t)|_0^{\pi/2} + \int_0^{\pi/2} 2t \sin(t) dt \\ &= \int_0^{\pi/2} 2t \sin(t) dt = -2t \cos(t)|_0^{\pi/2} + \int_0^{\pi/2} 2 \cos(t) dt = 2 \sin(t)|_0^{\pi/2} = 2. \end{aligned}$$

Такође двоструком парцијалном интеграцијом изводимо да за $n \geq 2$ важи

$$\begin{aligned}
I_n &= \frac{1}{n!} \int_0^{\pi/2} (\pi^2/4 - t^2)^n \cos(t) dt \\
&= \frac{1}{n!} \left((\pi^2/4 - t^2)^n \sin(t) \Big|_0^{\pi/2} + \int_0^{\pi/2} 2nt(\pi^2/4 - t^2)^{n-1} \sin(t) dt \right) \\
&= \frac{2}{(n-1)!} \int_0^{\pi/2} t(\pi^2/4 - t^2)^{n-1} \sin(t) dt \\
&= \frac{2}{(n-1)!} \left(-t(\pi^2/4 - t^2)^{n-1} \cos(t) \Big|_0^{\pi/2} + \right. \\
&\quad \left. \int_0^{\pi/2} ((\pi^2/4 - t^2) - 2(n-1)t^2)(\pi^2/4 - t^2)^{n-2} \cos(t) dt \right) \\
&= \frac{2}{(n-1)!} \int_0^{\pi/2} ((2n-1)(\pi^2/4 - t^2) - 2(n-1)\pi^2/4)(\pi^2/4 - t^2)^{n-2} \cos(t) dt \\
&= \frac{4n-2}{(n-1)!} \int_0^{\pi/2} (\pi^2/4 - t^2)^{n-1} \cos(t) dt - \frac{\pi^2}{(n-2)!} \int_0^{\pi/2} (\pi^2/4 - t^2)^{n-2} \cos(t) dt \\
&= (4n-2)I_{n-1} - \pi^2 I_{n-2}.
\end{aligned}$$

Из доказаних једнакости

$$\begin{aligned}
I_0 &= 1, \\
I_1 &= 2, \\
n \geq 2 &\Rightarrow I_n = (4n-2)I_{n-1} - \pi^2 I_{n-2}
\end{aligned}$$

слиди да за свако $n \geq 1$ постоји полином $P_n(x)$ са целим коефицијентима, степена мањег од n такав да важи $I_n = P_n(\pi^2)$. Такође је $I_n > 0$ као интеграл позитивне функције. Претпоставимо да је $\pi^2 = p/q$ за неке $p, q \in \mathbb{N}$ и изведимо контрадикцију. Очигледно је

$$I_n q^{n-1} = P_n(p/q) q^{n-1}.$$

Обзиром да је P_n полином са целим коефицијентима степена нижег од n , вредност израза на десној страни једнакости је цео број, док је вредност израза на левој страни једнакости већа од нуле. Одатле слиди да је $I_n q^{n-1} \geq 1$, односно

$$I_n \geq q^{1-n}.$$

Са друге стране је

$$I_n \leq \frac{1}{n!} \int_0^{\pi/2} (\pi^2/4)^n dt = \frac{(\pi/2)^{2n+1}}{n!}.$$

Дакле,

$$q^{1-n} \leq \frac{(\pi/2)^{2n+1}}{n!},$$

односно

$$n! \leq \frac{\pi}{2q} \left(\frac{\pi^2 q}{4} \right)^n.$$

Обзиром да n може бити произвољно велики природан број, овде имамо контрадикцију са теоремом 5. Стога је број π^2 ирационалан. \square

Теорема 22 (Ламберт) Број π је ирационалан.

Доказ: Тврђење следи из теорема 21 и 13. \square

7 Тригонометријске и инверзне тригонометријске функције

Теорема 23 За свако $\alpha \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ број $\cos(\alpha)$ је ирационалан.

Доказ: Обзиром да је $\cos(-\alpha) = \cos(\alpha)$, довољно је доказати теорему у случају када је $\alpha > 0$. Нека је $\alpha = p/q$ за $p, q \in \mathbb{N}$ и нека је

$$f_n(x) = \frac{x^{n-1}(p-qx)^{2n}(2p-qx)^{n-1}}{(n-1)!}, \quad g_n(x) = f_n(\alpha-x), \quad F_n(x) = \sum_{k=0}^{2n-1} (-1)^k f_n^{(2k)}(x).$$

Очигледно је $f_n(x) = g_n(\alpha-x)$, из чега индукцијом следи да је $f_n^{(k)}(x) = (-1)^k g_n^{(k)}(\alpha-x)$, односно

$$F_n(x) = \sum_{k=0}^{2n-1} (-1)^k g_n^{(2k)}(\alpha-x),$$

односно

$$F_n(\alpha) = \sum_{k=0}^{2n-1} (-1)^k g_n^{(2k)}(0), \quad F_n'(\alpha) = \sum_{k=0}^{2n-2} 2k(2k-1)(-1)^{k+1} g_n^{(2k+1)}(0).$$

Из једнакости

$$p-qx = (\alpha-x)q, \quad (\alpha^2 - (\alpha-x)^2)q = x(2\alpha-x)q = x(2p-qx)$$

следи да је

$$g_n(x) = \frac{x^{2n}(\alpha^2-x^2)^{n-1}q^{3n-1}}{(n-1)!},$$

односно $g_n(x) = h_n(x^2)$ за

$$h_n(x) = \frac{x^n(\alpha^2-x)^{n-1}q^{3n-1}}{(n-1)!}.$$

Одатле и из теореме 12 следи да је $g_n^{(2k+1)}(0) = 0$ за свако k и самим тим да је $F_n'(\alpha) = 0$. Из теореме 11 закључујемо да је $F_n(\alpha)$ цео број дељив са $\frac{(2n)!q^{n+1}}{(n-1)!} = (n+1)!q^{n+1}\binom{2n}{n-1}$, па самим тим и са n . Применом исте теореме закључујемо да је $F_n(0)$ цео број који није дељив са n у случају да је n непаран прост број који не дели p . Непосредним рачуном добијамо

да је

$$\begin{aligned}
\int_0^\alpha f_n(x) \sin(x) dx &= \int_0^\alpha (F_n(x) + F_n''(x)) \sin(x) dx \\
&= \int_0^\alpha F_n(x) \sin(x) dx + \int_0^\alpha F_n''(x) \sin(x) dx \\
&= -F_n(x) \cos(x)|_0^\alpha + \int_0^\alpha F_n'(x) \cos(x) dx + \\
&\quad F_n'(x) \sin(x)|_0^\alpha - \int_0^\alpha F_n'(x) \cos(x) dx \\
&= F_n(0) - F_n(\alpha) \cos(\alpha) + F_n'(\alpha) \sin(\alpha) - F_n'(0) \sin(0) \\
&= F_n(0) - F_n(\alpha) \cos(\alpha).
\end{aligned}$$

Претпоставимо да је $\cos(\alpha) = r/s$ за неко $r \in \mathbb{Z}$ и $s \in \mathbb{N}$. Уколико је n непаран прост број који осим p не дели ни s , онда је

$$s \int_0^\alpha f_n(x) \sin(x) dx = F_n(0)s - F_n(\alpha)r$$

цео број који није дељив са n , па самим тим није нула. Међутим,

$$\left| s \int_0^\alpha f_n(x) \sin(x) dx \right| \leq s\alpha \frac{\alpha^{n-1} p^{2n} (2p)^{n-1}}{(n-1)!} = \frac{s\alpha p^2 (2\alpha p^3)^{n-1}}{(n-1)!}.$$

На основу теорема 9 и 5 n се може изабрати тако да буде тако велики прост број, да осим што премашује p и s важи

$$\frac{s\alpha p^2 (2\alpha p^3)^{n-1}}{(n-1)!} < 1,$$

што је контрадикција обзиром да не постоје цели бројеви различити од нуле, који су уз то по апсолутној вредности мањи од 1. \square

Теорема 24 За свако $\alpha \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ бројеви $\sin^2(x)$, $\cos^2(x)$ и $\tan^2(x)$ су ирационални.

Доказ: Тврђење следи из теорема 23 и 13 и једнакости

$$\cos(2x) = 2 \cos^2(x) - 1 = 1 - 2 \sin^2(x) = \frac{2}{1 + \tan^2(x)} - 1.$$

\square

Теорема 25 За свако $\alpha \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ бројеви $\sin(x)$, $\cos(x)$ и $\tan(x)$ су ирационални.

Доказ: Тврђење следи из теорема 24 и 13. \square

Теорема 26 За свако $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ такво да $x^2 \in \mathbb{Q}$, број $\arctan(x)$ је ирационалан, а ако је још и $|x| \leq 1$, онда су и бројеви $\arcsin(x)$ и $\arccos(x)$ ирационални.

Доказ: Ако је број $\alpha = \arctan(x)$ рационалан, онда је према теорему 24 број $\tan^2(\alpha) = x^2$ ирационалан супротно претпоставци. Слично се доказује и преостали део тврђења. \square

Из претходне теореме следи да је на пример $\arctan(\sqrt{2})$ ирационалан број.

Теорема 27 За свако $x \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ број $\arctan(x)$ је ирационалан, а ако је још и $|x| \leq 1$, онда су и бројеви $\arcsin(x)$ и $\arccos(x)$ ирационални.

Доказ: Тврђење следи из теореме 26. \square

8 Хиперболичке и инверзне хиперболичке функције

Теорема 28 *За свако $\alpha \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ број $\cosh(\alpha)$ је ирационалан.*

Доказ: Изводи се слично доказу теореме 23, с тим да због

$$\int_0^\alpha F_n(x) \sinh(x) dx = F_n(\alpha) \cosh(\alpha) - F_n(0) - \int_0^\alpha F_n'(x) \cosh(x) dx$$

и

$$\int_0^\alpha F_n''(x) \sinh(x) dx = F_n'(\alpha) \sinh(\alpha) - \int_0^\alpha F_n'(x) \cosh(x) dx$$

треба изабрати

$$F_n(x) = \sum_{k=0}^{2n-1} f_n^{(2k)}(x)$$

да би важило $f_n(x) = F_n(x) - F_n''(x)$ и самим тим

$$\int_0^\alpha f_n(x) \sinh(x) dx = F_n(\alpha) \cosh(\alpha) - F_n(\alpha) - F_n'(\alpha) \sinh(\alpha),$$

односно да би се пократило $\int_0^\alpha F_n'(x) \cosh(x) dx$. \square

Приметимо да из теореме 28 и једнакости

$$\cosh(x) = \frac{e^x + (e^x)^{-1}}{2}$$

слиди теорема 19.

Теорема 29 *За свако $\alpha \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ бројеви $\sinh^2(x)$, $\cosh^2(x)$ и $\tanh^2(x)$ су ирационални.*

Доказ: Тврђење слиди из теорема 13 и 28 и једнакости

$$\cosh(2x) = 2 \cosh^2(x) - 1 = 1 + 2 \sinh^2(x) = \frac{2}{1 - \tanh^2(x)} - 1.$$

\square

Теорема 30 *За свако $\alpha \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ бројеви $\sinh(x)$, $\cosh(x)$ и $\tanh(x)$ су ирационални.*

Доказ: Следи из теорема 13 и 29. \square

Повежимо још једном ирационалност бројева облика e^x са хиперболичким функцијама.

Теорема 31 *За свако $x \in \mathbb{R}$ бројеви e^{2x} и $\tanh(x)$ су или оба рационална или оба ирационална.*

Доказ: Тврђење слиди теореме 13 и једнакости

$$\tanh(x) = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1}, \quad e^{2x} = \frac{1 + \tanh(x)}{1 - \tanh(x)}.$$

\square

Теорема 32 *За свако $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ такво да $x^2 \in \mathbb{Q}$ број $\operatorname{asinh}(x)$ је ирационалан, а ако је још и $|x| < 1$, онда је и број $\operatorname{atanh}(x)$ ирационалан, док је у случају да је $|x| \geq 1$ број $\operatorname{acosh}(x)$ ирационалан.*

Доказ: Ако је број $\alpha = \operatorname{asinh}(x)$ рационалан, онда је према теорему 29 број $\sinh^2(\alpha) = x^2$ ирационалан супротно претпоставци. Слично се доказује и преостали део тврђења. \square

Теорема 33 *За свако $x \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ број $\operatorname{asinh}(x)$ је ирационалан, а ако је још и $|x| < 1$, онда је и број $\operatorname{atanh}(x)$ ирационалан, док је у случају да је $|x| \geq 1$ број $\operatorname{acosh}(x)$ ирационалан.*

Доказ: Тврђење следи из теорема 13 и 32. \square